新北市萬里區衛生所針扎事件處理流程

被針頭等尖銳物品刺傷或割傷時

↓

1.立刻擠壓傷口處血管使血流出

↓

2.在流動下水清洗傷口五分鐘

黏膜與病患之血液、體液接觸時

↓

1.口腔：以流動水清洗

↓

2.眼睛：以流動水或0.9%生理食鹽水沖洗

↓

向主管報備並填寫尖銳物品扎傷報告單

↓

詳查病患抗原及抗體

anti-HIV、HBsAg、anti-HBs、anti-HBc、 anti-HCV、VDRL

↓

以上各項若有不明者，應立即抽病患血液檢查
（請醫師幫病患抽血送檢，並在病患病歷上註明needlestick injury）

↓

工作人員請攜帶健保IC卡掛號至診間抽血檢查：

- 病　患 HIV(+)
- 病　患 HBsAg(+)或[HBsAg(-)、anti-HBs(-)、anti-HBc(+)]
- 病　患 anti-HCV(+)
- 病　患 VDRL(+) TPHA≧1:80

工作人員抽血檢驗anti-HIV轉診感染科視情況服用AZT及抗愛滋藥物

↓

扎傷後、六週、三個月、六個月、一年、定期追蹤anti-HIV

工作人員如HBsAg、anti-HBs情形不明

↓

立即抽血檢查

- 工作人員HBsAg(+)或anti-HBs(+)或anti-HBc(+)

↓

不需注射疫苗或HBIG

- 工作人員HBsAg(-) anti-HBs(-)未注射疫苗

↓

24小時內注射HBIG並接受HBV疫苗注射

- 工作人員HBsAg(-) anti-HBs(-)已完成疫苗注射未產生抗體

↓

儘快注射HBIG補一劑疫苗

- 工作人員HBsAg(-) anti-HBs(-)正接受疫苗注射未產生抗體

↓

儘快注射HBIG繼續完成疫苗注射

工作人員抽血檢驗anti-HCV

- 工作人員anti-HCV(+)

↓

繼續追蹤肝功能G OT、GPT

- 工作人員anti-HCV(-)

↓

扎傷後三個月、六個月、一年抽血檢驗anti-HCV G OT、GPT

Penicillin預防注射

扎傷後六個月、一年追蹤HBsAg、anti-HBs、anti-HBc、G OT、GPT